

Über Osteomyelitis des Schambeins

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Medizinischen
Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,

vorgelegt von

Karl Böhm

Medizinalpractikant, Heidelberg

Druck: Presseverein Buchen G. m. b. H.

Meinen lieben Eltern in Dankbarkeit gewidmet.

Referent: Geh. Rat Prof. Dr. Enderlen

Dekan: Prof. Dr. Schminke.

Gedruckt mit Genehmigung
der medizinischen Fakultät zu Heidelberg.

Die Osteomyelitis des Schambeins gehört zu den seltensten Lokalisationen der Osteomyelitis, zu den seltensten Krankheitsbildern überhaupt. Nichtsdestoweniger sind doch im Laufe der verfloßenen Jahrzehnte mehrere umfangreiche Arbeiten und Statistiken über diese seltene Affektion erschienen. Diese Arbeit soll diese Berichte kurz zusammenfassen, ihnen die Heidelberger Fälle, 5 an der Zahl, beschreibend anschließend und einige Betrachtungen über die Osteomyelitis des Schambeins bringen.

Die erste größere Arbeit über die Osteomyelitis der platten Knochen bringt Fröhner in seinen „Beiträgen zur Kenntnis der akuten spontanen Osteomyelitis der kurzen und platten Knochen“ (Beitr. z. klin. Chir. 1899, Band 9). Er stellt in seiner Arbeit ein Verhältnis der Affektion der kurzen und platten Knochen zu den langen Röhrenknochen auf und findet 1:12. Er betrachtet 51 Fälle und kein einziger Fall des Schambeins ist in dieser Statistik enthalten. Die Verteilung ist interessant, besonders im Hinblick auf die später von mir aufgestellte Gesamtstatistik der Heidelberger Fälle sämtlicher behandelter Osteomyelitiden in den Jahren 1920 bis 1930 (Juli). Wir finden bei Fröhner:

Fälle:	Clavicula	11
	Scapula	9
	Os ileum	9
	Calcaneus	7
	Costae	3
	Os occipitis	2
	Os zygomaticum	2
	Mandibula	2
	Talus	2
	Os nasala	1
	vertebrae	1
	Os sacrum	1
	Os naviculare	1

Er bemerkt weiter in seiner Abhandlung: „Die kurzen und platten Knochen werden bekanntlich verhältnismäßig selten von akuter Osteomyelitis befallen und wir finden in den Lehrbüchern außer der Angabe, dieser Tatsache fast nichts über diese Affektion erwähnt. Auch die bisher gebotene Kasuistik ist eine äußerst spärliche, wie auch in den klinischen Jahresberichten

höchst selten diese Fälle aufgeführt werden. Vielleicht mag der Umstand Schuld sein, daß die akute Osteomyelitis an kurzen und platten Knochen nicht immer in gleich typischer und schwerer Weise auftritt.“ Die erste größere Arbeit, welche die Osteomyelitis des Schambeins behandelt, stammt von Kirdner. (Arch. f. klin. Chir. Bd. 58 S. 315 ff.). Er beschreibt einen Fall von akuter symmetrischer Osteomyelitis beider Schambeine mit Epiphysenlösung. Es handelte sich um einen 21jährigen, kräftigen Ulanen, der sich mit der Lanze eine kleine Verletzung am rechten Knie zugezogen hatte. Nachdem er Schmerzen im Oberschenkel bekam, meldete er sich 8 Tage nach der Verletzung krank. Im Garnisonlazarett Düsseldorf aufgenommen, entwickelte sich der Fall folgendermaßen: Im Verlauf von 5 Tagen verfiel der Patient immer mehr und mehr. Der Appetit nahm ab, schließlich wurde er apatisch, delirierte, ließ unter sich und das Fieber blieb auf Morgentemperatur von $39,1^{\circ}$ und Abendtemperatur von $39,7^{\circ}$. In der Unterbauchgegend war weder Oedem, noch Fluktuation, noch Hautröte zu sehen, jedoch aber eine verdächtige Härte in der Symphysegegend. Kirdner vermutete eine Bauchdeckenvereiterung und operierte trotz schlechtesten Allgemeinbefindens des Patienten. Es zeigte sich, daß beide Schambeine symmetrisch ergriffen waren, sowohl der rechte als auch der linke horizontale Schambeinaast. Die Schambeinfuge zeigte sich in der Mitte gelpalten; der rechte horizontale Schambeinaast wurde entfernt, der linke belassen, er wurde nur, soweit nekrotisch, reseziert. Der medialste Schambeinabschnitt links neben der Symphyse wurde mit der Symphyse entfernt. Alles in allem lag ein schwerer Eingriff vor, der aber von dem Patienten gut überstanden wurde; Dank der radikalen Entfernung alles erkrankten Knochens und Knorpels. Eine Thierische Transplantation war überflüssig und der stehen gebliebene Knochen bildete soviel neues Knorpelgewebe, daß sich beide Schambeine in der Mitte wieder knöchern mit einander verbanden. Kirdner faßte den Prozeß, da er gerade an den medialen Enden der Schambeine faß, als Epiphysenlösung auf, indem er annahm, daß dort sich Epiphysekerne befinden müßten. Nachdem er aus keinem wissenschaftlichen Werk damals sich vergewissern konnte, ob dort tatsächlich Epiphysekerne seien, wurde Kirdner auf seine Anfrage bei Herrn Professor Merkel, Göttingen, dahin erklärt, daß an jener Stelle sich Epiphysekerne befinden, die im 22. bis 25. Jahre verknöcherten, welche aber erst im 15. bis 16. Jahre sich bildeten. Hieraus ergibt sich, daß diese die Form einer Osteomyelitis

adolescentium ist, welche erst nach Eintritt der Pubertät auftreten kann.

Als Ursache dieser Osteomyelitis sieht Kirchner das Trauma an und zwar das Reiten. In der Tat ist es auch auffällig, daß gerade 2 Schambeine symmetrisch befallen werden und außerdem bei einem Ulanen, der angestrengte Ritte ausführen mußte. Als weiteres Moment für die Entstehung von Osteomyelitiden betrachtet er die Ermüdung, welche er aber in diesem Falle ausschließt, da sich der Ulan nach dem Reiten nie besonders müde und überanstrengt fühlte. Den Einfluß des Traumas auf die Entstehung der Osteomyelitis erklärt er mit Kocher folgendermaßen: Die Kapillaren an der epiphyären Schichte des Knorpels haben kleine Umbiegungen und Knickungen; durch Zerrungen werden diese noch mehr geknickt und der Blutstrom verlangsamt und so ein Haftenbleiben der pathogenen Mikroben begünstigt. Lannelongue und auch Ullmann berichteten von einer Reihe von Fällen, welche den Eindruck erwecken müßten, daß sogar Ermüdung als Aetiologie in Frage käme. Kirchner jedoch legt sie alle als Trauma aus. Das eine steht fest, daß die Ermüdung mit dem Trauma zusammen gewiß keine unbedeutende Rolle spielt!

Einen weiteren interessanten Fall beschreibt Esau ausführlich in der Deutschen Zeitschrift für Chirurgie Band 91 S. 611 ff., welcher in der chirurgischen Universitätsklinik zu Greifswald beobachtet wurde. Es handelt sich um eine akute Osteomyelitis des rechten Schambeins mit zentraler pathologischer Luxation des Oberschenkels. Ein 10jähriges Mädchen erkrankte plötzlich nach mehrtägiger heftiger Anstrengung (Kartoffelausmachen) mit Schmerzen in der Unterbauchgegend und zeigte geringes Erbrechen. Die Temperaturen stiegen an und die Schmerzen strahlten in das rechte Bein aus, welches das Kind angezogen hielt. Das Kind schrie und zeigte große Unruhe. Es begann dann auch die rechte Unterbauchseite zu schwellen. Trauma war nicht zu eruieren. Das Kind wurde dann in die Klinik eingeliefert und dort operiert. Schnitt über dem Darmbeinschaufelrande. Haut, Unterhautfettgewebe, Faszie und Muskulatur alles blutig durchtränkt, auf der rechten Seite hinter der Symphyse befindet sich eine abgekapselte Vorwölbung, welche sich in die linke Beckenschaufelhälfte erstreckt. Der Abzeß wird punktiert und es kommen ungeheure Mengen gelblich-weißen Eiters heraus. Die Höhle wird gespült, tamponiert und geschlossen. Im Eiter Streptokokken. Die Eiterung läßt aber nicht nach. Das Kind verfällt immer mehr und die Temperaturen steigen wieder an. Die Nahrungsaufnahme

wird immer schlechter. Somnolenz. Nach 4 Wochen Exitus letalis.

Das Röntgenbild zeigte folgendes: Der linke obere und untere Schambeinaast sind vollständig aus dem Beckenring gelöst. Die Gelenkpfanne ist vollständig zerstört, der Schenkelkopf mit samt Schenkelhals steht vollständig im Becken und medial davon das nach innen luxierte und nach unten und vorn verschobene Os ischii.

Am mazerierten Becken zeigt sich, daß die knorpeligen Verbindungen zwischen Os pubis, Os ischii und Acetabulum vollständig gelöst sind. Nur einige Bandfetzen verbinden letzteres noch mit dem Ramus inferior des Schambeins. Der Symphylenknorpel ist ebenfalls gelöst, der Knochen ist des Periostes entblößt und mißfarben. Anstatt des Y-förmigen Knorpels sieht man einen breit klaffenden Spalt. Die Oberfläche des Schenkelkopfes hat nur noch Reste des Knorpelüberzuges. Ligamentum teres, Bandapparat und Gelenkkapsel fehlen. Der Schenkelhals steht $2\frac{1}{2}$ cm tief im Becken und hat kein Periost. Große Ähnlichkeit hat dieser Fall mit dem von Kirdner beschrieben darin, daß wieder eine Epiphylenlösung vorliegt und wiederum die Schambeinfuge gespalten war.

K a r e w s k i berichtet über einen ähnlichen Fall, der den ganzen absteigenden Schambeinaast betrifft. Er rezezierte 36 Stunden nach Beginn der Krankheit und hatte ausgezeichneten Erfolg. Er tritt für die sofortige und radikale Operation der Osteomyelitiden des Schambeins ein. Für veraltete Fälle und „in Eiter gebadete Knochen“ ist es einerlei, ob sie entfernt werden oder nicht. —

Wohl die ausführlichste und schönste Arbeit über die Osteomyelitiden des Beckens hat A. v. B e r g m a n n geschrieben, betitelt „Erfahrungen über Beckenosteomyelitis“. 71 Krankengeschichten sind in kurzem Auszug wiedergegeben, darunter sind 3 Fälle von akuter primärer Osteomyelitis des Schambeins. (Beschreibung der Fälle s. Tabelle Seite 8a). Als besondere Kriterien der Osteomyelitis des Schambeins kennzeichnet v. Bergmann folgende:

1. Schwellung der Inguinalgegend,
2. die Gefäße erscheinen mehr nach vorne gerückt,
3. die Pullation der Arteria femoralis wird deutlich,
4. starke Füllung der Hautvenen,
5. Schwellung.

Fehlt diese, so ist sie doch im Becken vorhanden und die Diagnose kann durch Palpation per rectum gestellt werden.

In Nr. 123 der Deutschen Zeitschrift für Chirurgie bringt Stabsarzt Dr. T h o m s c h k e eine ausführliche Arbeit über die

akute Osteomyelitis des Schambeins. Thomschke hatte die Gelegenheit, im Laufe eines Vierteljahres 3 (!) Fälle von akuter Osteomyelitis des Schambeins im Garnisonlazarett Metz zu behandeln. Dieser einzig dastehende Zufall, in solch kurzer Zeit gleich 3 Fälle dieser äußerst seltenen Erkrankung zu Gesicht zu bekommen, veranlaßte ihn, eine größere Arbeit zu veröffentlichen. Er geht ausführlich auf die Arbeit Fröhner's ein und ebenso auf die von v. Bergmann's. Er bespricht die von ihm behandelten Fälle mit denen von v. Bergmann zusammen. Er betrachtet die Osteomyelitis des Schambeins als eine der seltensten Krankheiten. Groß ist anderer Ansicht. Er schreibt: „In Wirklichkeit — ich verfüge über ein Material von über 50 Beobachtungen der Beckenosteomyelitiden unserer Klinik (Jena) und ein größeres durch Zusammenstellung aus der Literatur — ist das Os pubis recht häufig affiziert, weit häufiger als z. B. der hinterste massive Abschnitt der Os coxae mit dem die Theorie als Prädispositionsstelle der Osteomyelitis zu rechnen glaubt“. Thomschke hat Recht, wenn er diese Ansicht von Groß korrigiert. Denn erstens steht die Statistik von Groß gar nicht zur Verfügung und zweitens weiß Thomschke nicht, ob der Verfasser die primäre Erkrankung des Schambeins meint. Drittens ferner sind alle anderen Autoren der Meinung, daß es sich um eine äußerst seltene Erkrankung handelt. Ich möchte hierzu bemerken, daß aus der Literatur außer den von mir zusammengestellten 11 Fällen und weiteren 5 Fällen aus der Heidelberger Klinik keine weiteren typischen Fälle bekannt sind. Natürlich bekommt man reichhaltigeres Material, wenn man die Fälle hinzufucht, wo von einer Beckenschäufel- oder Hüftgelenk- oder einer sonstigen Affektion eine Fortleitung des Prozesses auf das Schambein statt hatte. Auch gibt es vereinzelte Fälle von diffuser Osteomyelitis des Beckenrings nach sonstigen putriden Erkrankungen der Beckenorgane. Endlich könnten auch zufällig einmal mehrere Fälle einer seltenen Erkrankung gehäuft auftreten. Sah doch Thomschke 3 Fälle von Schambeinosteomyelitis in einem Vierteljahr. Der Statistik Groß's stehen andere gegenüber, welche gerade das Gegenteil seiner Behauptung auslagen. So findet Fröhner unter 51 Fällen neunmal das Os ileum, einmal das Os sacrum, das Os pubis überhaupt nicht. v. Bergmann findet unter 71 Beckenosteomyelitiden dreimal nur das Os pubis primär und dreimal mit anderen Knochen zusammen affiziert. An der Heidelberger Klinik hatten wir im Verlauf von beinahe 10 Jahren 424 Fälle von Osteomyelitis. Davon 33 des Beckens, hiervon wieder 5 des Os pubis und bei diesen 5 sind es wiederum nur 3 typische Fälle. Wenn man bedenkt, welch ungeheures

Krankenmaterial in unserer Klinik jährlich zusammenkommt (durchschnittlich ca 4000 stationäre Fälle pro Jahr) und im Verlauf von 10 Jahren das Os pubis nur fünfmal unter den Beckenosteomyelitiden erscheint, welche ihrerseits nur den 13. Teil sämtlicher Osteomyelitiden ausmachen, kann man nicht mehr wie Groß behaupten, daß das Os pubis „recht häufig affiziert sei“.

Plaut berichtet von einer umschriebenen Osteomyelitis des Schambeins unter dem Bilde der tuberkulösen Analfistel bei einem Kinde. Ein 6jähriger familiär tuberkulös belasteter Knabe wird wegen Analfistel in das Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Krankenhaus Berlin eingewiesen. Es besteht ein klinisch und röntgenologisch als tuberkulös nachgewiesener Herd im rechten Hilus und Mittellappen, ferner linksseitige pleuritische Schwarte. Da das Kind zudem noch 4 Wochen fieberte, nachts schwitzte, so nahm man die Analfistel als tuberkulöser Natur an. Die Behandlung war entsprechend. Das Kind gedieh und nahm zu, jedoch die Analfistel trotz jeder Behandlung.

Operation: Es wurde ein Sequester entfernt. Dann glatte Heilung. Die Röntgenkontrolle zeigte eine abgeheilte Osteomyelitis. Nachträglich konnte das Trauma eruiert werden und die sich daran anschließende Erkrankung des Kindes. Das Kind hatte nämlich ein heftiges Trauma der Symphyse anschließend Delirien und Schmerzen im Obersehenkel und Fieber. Die Mutter fand „dünne klebrige“ Stühle im Bett, welche ohne Zweifel kein „Stuhl“, sondern „Eiter“ waren. Auf Grund dieses Nachtrages darf die Fistel als nicht-tuberkulös angesehen werden. Plaut machte auf folgende 3 Punkte aufmerksam:

1. Seltener Sitz am Os pubis. Grund: geringer Spongiosaanteil.
2. a) Auffallend guter Verlauf der Operation im akuten Stadium (Walter).
 b) Die Beckenosteomyelitis gilt als äußerst gefährlich.
 c) Radikale Entfernung bis ins Gefunde ist unbedingt erforderlich.
 d) Nicht operierte Fälle bekommen zahlreiche Metastasen (Pleuraempyem, Abzesse usw.).
3. Der ungewöhnliche Sitz der Fistel ist auffallend.

Es folgt nun eine Tabelle der Literaturfälle über die Osteomyelitis des Schambeins.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Fall	Be- schreiber	Alter des Pat.	Beruf	frühere Erkrankung	Trauma	Anamnese Siehe auch Spalte 8-15!	Puls	Temp.	Ort größter Schmerzhaft- igkeit	Schwellung	Oedem.	Fluktuation	Puls der a. fem.	Venen- zeichnung	Oberschenkel- haltung	Kompli- kationen	Metastasen	Erreger	Roe-Bild	Lokalisation u. Operation	Resec. Knochen Histol. Präep.	Ausgang
1	Kirchner	21	Ulan	%. Reiten(?)	Verletzungen am Knie, Appetitlosigkeit, Apathie, Schmerzen, Fieber	100	> 39	Leistenbeuge	Symphysen- Gegend: %.	%.	%.	%.	%.	%.	(?)	%.	%.	Staphylo- und Pneumo- kokken	%.	symetrisch. beide oberen u. unteren Schambeinäste Totale Resektion der beiden Schambeinäste	%.	Heilung Knochen- regeneration
2	Karewski	9	%. 14 Tage vor- her Angina	Gering- fügig	Schmerzen im Hüftgelenk acut aufgetreten	—	hohes Fieber	Hüftgelenk	Symphysen- Gegend Leistenbeuge	%.	%.	%.	%.	%.	?	%.	%.	?	%.	Absteig linker Schambeinast Resektion	%.	Heilung
3	v. Bergmann	23	Arbeiter	5 Jahre vor- her erkrankt mit Schüttel- frost und Schmerzen sonst nie krank	?	Schmerzen im Bauch. Kein Ab- gang von Urin, Kot und Flatus Bewegungen des linken Beins in der Symphyse schmerzhaft	64 unre- gel- mäßig klein weich	39,5	Rectus inser- tion druck empfindlich	links vor der Symphyse über dem Tuberculum pubicum	%.	%.		%.	I. Bein im Hüftgelenk leicht flektiert gehalten. Be- wegungen ver- ursachen Schmerzen	Pneumonie Schwellung der rechten Schulter	%.	Staphylo- kokken	linkes tuber- culum publi- cum abnorm durchlässig	horiz. linker Schambeinast Resection d. linken Schambeinastes von der Symphyse bis 3. for. obtur. Tamponade. (Beim Medianschnitt über der Symph. reichlich Eiter)	%.	gebessert mit wenig sesernieren der Fistel entlassen
4	v. Bergmann	22	Arbeiter	%. ?	Schüttelfrost. Schmerz in der Leiste in das rechte Bein aus- strahlend. Kopfschmerzen	gut	38,2	Leistenbeuge	r. Leistenge- gend u. Scar- pasches Dreieck, geschwol- lene Leisten- drüsen	%.	%.		Scheint deut- lich nach vorne verschoben	%.	%.	Vereiterung d. Gelenks Decu- bitus am Kreuzbein und Schulter	%.	Staphylo- kokken	%.	horiz. r. Schambeinast Osteotomie. Eröffnung des Gelenks Füllung des Gelenks mit Jodoform- glyzerin. Tamponade Verband- Schiene	%.	Heilung unter Ab- stoßung von Sequestern. Heilung des Decubitis.
5	v. Bergmann	25	Arbeiter	%. ?	Vor 3 Wochen mit Schmerzen im I. Oberschenkel erkrankt.	90	38,4	horizon. Schambeinast links u. oberes Femur Drittel.		%.	%.	%.	%.	%.	normal. Be- wegungen sind im Hüft- gelenk schmerz- haft.	Schwellung über dem Ster- num Spontan- fractur des I. Obersch. aufst. I. Ast ist aus d. Zusammen- hang mit dem Sitzbein gelöst	Malleolus lat. des r. Fußes I. Oberkiefer Abszess am dorsum penis Verschleppung der Staphylo- kokken in die Lunge	Staphylo- kokken	%.	horiz. linker Schambeinast Resection des horizontalen I. Scham- beinastes / Glättung des Sitzbein- knorren.	Hyperämie Erweichung Schwammig. Knochenbe- schaffenheit	† Section: De- cubitus am Bein u. Nak- ken Femur- kopf % ohne Knorpelüber- zug Abszesse am Sitzbein Nierenabsc.
6	Thomschke	unbek.	Unteroff. (Maurer)	Erkältung im Manöver	Tritt auf das Knie	Schmerzen in der r. Leisten- gend, Bein kann nicht aktiv bewegt werden. Kopfschmerzen	100	40,2	Leistengegend rechts ober- u. unterhalb d. Schbl.	Leistendrüse Blasengegend Hoden geschw.	Oberschenkel	%.	%.	%.	aktiv unbeweglich	Hodenschwel- lung Decubitus am Bein und Thrombose (L) Vereiterung d. Hüftgelenks Spontan- Beck- ken- Fractur	%.	Nicht unter- sucht	%.	horizontaler r. Schambeinast Osteotomie Gegenincision an der Innenseite des Oberschenkels (ergibt keinen Eiter) Tamponade - Verband Incision des linken Hodens	%.	† Patient wird benommen Section ver- boten
7	Thomschke	unbek.	Infan- terist (landw. schaft Arbeiter)	nie ernstlich krank einige Tage zuvor Eiterblase a. I. Knöchel	?	Plötzlich heftige Schmerzen in der I. Leistengegend. Erkältung	84	39,2	Leistenbeuge linker oberer Schambeinast u. Symphyse	Handteller- groß links am Poupart'schen Band	%.	%.	%.	%.	Im Hüftgelenk gebeugt	%.	%.	Staphylo- kokken	nach der Op. neu gebildete Knochenspan- ge an Stelle des linken hor. Astes	horizontal. l. Schambeinast Osteotomie nur ein kleiner gesunder Spahn blieb stehen	%.	Heilung
8	Thomschke	unbek.	Infan- terist (Acker- knecht)	nie krank	heftige Anstren- gung (?)	Schmerzen in der Leisten- u. Blasengegend. Bewegungen des Beines sind schmerzhaft.	%.	40,1	Leisten- und Blasengegend rechter, hor. Schambeinast	oedematöse Schwellung der Leisten- gend bis zum Femur	Oedem am am Ober- schenkel	+	%.	%.	auswärts rotiert und gebeugt	Senkungs- abszess in den Oberschenkel	%.	Staphylo- kokken	nach der Ope- ration: Schat- ten in der Symphysen- gend an Stelle des r. hor. Scham- beinastes Kno- chenspange	horizontal. r. Schambeinast Entfernung des hor. Schambeinastes bis auf eine kleine Spange. Spaltung der nach dem Oberschenkel zu führenden Eiterhöhle. Unterbindung der Vena saphena magna. Tamponade. Maslixverband.	%.	Heilung
9	Esau	10 jähr. Mäd- chen	%. ?	nie ernstlich krank gewesen	heftige Anstren- gung (?)	plötzlich Fieber. Schmerzen Appetitlosigkeit. Obstipation Abmagerung.	130	39	rechte Bauch- seite und Beine	r. Unterbauch- gend und r. Oberschenkel	Oberschenkel Schenkelbeuge und äußere Genitalien	über dem r. Schambein nicht sicher nachzuweisen	%.	in der Leisten- beuge und Genitalien deutlich	r. Bein in stärkster Beugung und Abduction	Cystitis. Epi- physenlösung in den Scham- beinästen und V-Fuge Luxa- tio centralis femoris	Endocard Mitralis- Nieren	Strepto- coccen	%.	horiz. und absteig. Scham- beinast rechts. Schnitt über den Geschwulst. Ein- gehen bis auf das Peritoneum und Eröffnen desselben. Abszess hinter der Symph. wird punctiert. Dann extraperitoneales. Eingehen auf den Tumor. Entleerung von Eiter - Spülung - Tamponade.	%.	† nach 10 Tg. Section: Cystitis. Endo und Pericarditis embol. Nierenabs- zesse.
10	Plaut	6 jähr. Knabe	%. ?	T B C pulmonum	Schweres Trauma	Fieber. Müdigkeit. Delirien. Analfistel. Sonst Anamnese tuberkulöser Natur.	%.	%.	rechter Ober- schenkel (Ueberlastung d. Schonung des linken)	%.	%.	%.	%.	%.	zieht beim Ge- hen das linke Bein nach	%.	%.	?	nach der Op. geheilt. Osteo- myelitis des I. Schamb. Knochennarbe	Ende des horiz. u. aufst. Schambeinastes links. (Keine TBC!) Sequesterentfernung und Auskratzung des Granulations- gew. Die antitub. Behandlung war erfolglos	Gut erhalten. Knochen mit klein. osteo- myel. Herden Kein Anhalt für T B.	Heilung
11	Klemm	10 jähr. Knabe	%. ?	?	?	Schmerzen im Hüftgelenk. Hinkt seit 3 Wochen.	120	39,1	Hüftgelenk	Damm und I. Scrotalhälfte	%.	%.	%.	%.	im Hüftgelenk leicht flektiert.	%.	%.	Strepto- coccen	%.	Horizontal. l. Schambeinast. Incision u. Ausschabung des erweich- ten Knochens.	%.	Heilung

An der Heidelberger Klinik beobachteten wir 5 Fälle von Osteomyelitis des Schambeins in den Jahren 1920 bis 1930. Drei davon waren typische Fälle, 1 eine tuberkulöse Osteomyelitis und 1 eine Caries der Symphyse mit Osteomyelitis. Es folgen nun die Krankengeschichten im Auszug:

Fall 1. S. J. 12 Jahre.

Diagnose: Osteomyelitis des horizontalen Schambeinastes. Sepsis.

Therapie: Inzision, Drainage.

Ausgang: Exitus letalis.

Anamnese: War als Kind nie krank. Fiel vor zwei Jahren vom Baum, erlitt Oberarmfraktur links mit nachfolgender Osteomyelitis. Wunde heilte ab, ebenso ging die Osteomyelitis zurück bis zur vollständigen Gefundung. Dann langsam zunehmende Schmerzen im linken Knie, Frost, hohes Fieber und verfallenes Aussehen.

Befund: Macht schwer kranken Eindruck. Frösteln. Cyanose der Lippen. Brustorgane o. B. Herzaktion sehr schnell. Puls ungleichmäßig, flatternd, 120. Temperatur 40°. Abdomen: In den unteren Partien links etwas mehr Resistenz als rechts. Linkes Bein ist im Hüftgelenk stark flektiert und wenig abduziert. (Rechtes Bein adduziert). Staudungsschmerz gering. Druck auf den Trochanter major schmerzhaft. Betastung des Femurs im oberen Drittel wenig druckempfindlich. Kein Oedem. Keine vermehrte Venenzeichnung. Seitlicher Druck auf das Becken nicht empfindlich. In der Gegend des linken horizontalen Schambeinastes größte Schmerzempfindlichkeit.

Diagnose: Osteomyelitis des linken horizontalen Schambeinastes. — Operation: (Geh.-Rat. Prof. Dr. Enderlen): In Narkose. Schnitt über dem Leistenband. Stumpfes Vorgehen gegen den horizontalen Schambeinast. Nach Durchtrennung der Faszie kommt Eiter. Der Knochen ist rauh. Drainage, Streifen. Im Eiter Staphylokokken. Am nächsten Tage Befinden schlecht, Delirien, Erbrechen, Puls trotz Kampfer und Coffein schlecht. Im Urin Albumen. Am übernächsten Tag Exitus letalis. Die Obduktion wurde verweigert.

Fall 2. J. F. 10 Jahre.

Diagnose: Osteomyelitis des Schambeins und Sitzbeins.

Therapie: Inzision, Drainage.

Ausgang: Gebessert entlassen.

Anamnese: Sonst gefundes Kind. Erkrankte angeblich 14 Tage vor Einlieferung in die Klinik im rechten Unterschenkel an Schmerzen, die dann zur linken Wade zogen und zum rechten Oberschenkel. Linke Wade schwell an. Das Kind bekam Fieber. Der zugezogene Arzt wies das Kind in die Klinik ein.

Befund: Starke Schmerzen in der linken Wade und im rechten Oberschenkel, Scrotum und Damm. Bewegungen sind schmerzhaft. Temperatur 39,6°. Keine entzündlichen Drüsen und Ausschläge. Sonst ist der Junge normal entwickelt, kräftig, guter E. Z. Innere Organe o. B., ebenso Hals und Rachen. Abdomen weich.

Lokalbefund: Linke Wade. Mitten in der linken Wade eine deutliche schmerzhaftes Resistenz tastbar, etwa fünfmarkstückgroß. Bewegungen im Knie frei, Fußbewegung schmerzhaft.

Rechter Oberschenkel: Deutlicher Schmerzpunkt an der Uebergangsstelle vom Oberschenkel zur Scrotaldammgegend. Hier auch Fluktuation nachweisbar. Bewegungen im Hüftgelenk sind frei. Schmerzen nur bei Muskelbewegungen. Keine Rötung. — Operation: (Prof. Klug). Narkose. Einschnitt an der Stelle der Fluktuation in der Symphysegegend. Stumpfes Eingehen, große mit gelblichem Eiter gefüllte Eiterhöhle, in deren Grunde man den absteigenden und aufsteigenden Schambeinaast tastet. Knochen überall glatt. Drain, Verband. Dann Schiene.

Ferner: Einschnitt über dem Schmerzpunkt der linken Wade. Ebenfalls kleine Eiterhöhle mit gelbem Eiter. Drain, Verband. Nach glattem Heilverlauf und abklingender Temperatur wird nach 6 Tagen plötzlich eine profuse Blutung aus der medialen Wunde bemerkt. Umstechung, Tamponade. Nach weiteren 12 Tagen noch verschiedene Temperatursteigerungen; aus der oberen Wunde entleert sich viel Eiter. Nach etwa 4 Wochen ist die Temperatur zur Norm gefallen. Eitersekretion hält noch an. Gutes Allgemeinbefinden. Verbandwechsel. Allmählich läßt die Wundsekretion nach. Langsame Granulierung der Wunde und Schluß. Nach 6 Wochen steht das Kind auf. Wunde ist gut vernarbt, keine Bewegungsstörungen. Gutes Allgemeinbefinden. Wird in häusliche Pflege entlassen.

In diesem Falle handelt es sich um eine akute Osteomyelitis in ihren Anfängen. Zeichen dafür sind, daß der Prozeß am Schambein noch keine Knochenrauhigkeit verursacht hatte und auf die Therapie gut reagierte. Rezidive wurden nicht beobachtet.

Fall 3. G. R. 12 Jahre.

Diagnose: Osteomyelitis des rechten horizontalen Schambeinaftes.

Therapie: Inzision, Drainage.

Ausgang: Gebessert entlassen.

Anamnese: Das Kind erkrankte 2 Wochen vor der eigentlichen Osteomyelitiserkrankung an Diphtherie. Es stellten sich Schmerzen in der rechten Hüfte ein, die sich rasch steigerten; und vom rechten Oberschenkel über den Unterleib und das Gefäß zur Hüfte zogen. Man hatte den Eindruck eines Abszesses. Hohes Fieber.

Befund: Kräftiges Mädchen in gutem E. Z. Sinnesorgane und Mund o. B. Rachen o. B. Thorax o. B. Abdomen: Schwache Rötung und starke Spannung. Extremitäten: Am rechten Oberschenkel und Unterleib bei Druck starke Schmerzen. — Operation: (Aethernarkose). Inzision am Gefäß rechts; kein Oedem, Schnitt völlig trocken; Naht, Verband. Am nächsten Tage: Schmerzhaftigkeit des rechten Oberschenkels, hält an, Temperatur fällt. Drei Tage später nochmalige Inzision in Aethernarkose: Schnitt am Oberschenkel. Es entleert sich reichlich Eiter. Am horizontalen Schambeinaft Rauigkeit und Defekt desselben. Abszeß ziemlich tiefgehend und ausgedehnt. Zwei Drains, Streifen, Verband. Die Schmerzen lassen nach, deutliche Besserung. 14 Tage später Anlegen eines Saugapparates, Gegeninzision. Im Eiter haemolytische Staphylokokken. Die Wunden heilen bald darauf gut aus. Die Röntgenaufnahme zeigt ausgedehnte Zerstörung des Schenkelhalbes. Herd am absteigenden rechten Schambeinaft. Es wird ein Gipsverband angelegt, später werden Sequester entfernt; einer stößt sich spontan ab. Fünf Monate später wieder neuer Gipsverband, bald darauf in ambulante Behandlung entlassen.

Ueber ein Jahr später befindet sich immer noch eine Fistel in der Gegend der alten Narbe in der rechten Leiste. Die Röntgenaufnahme zeigt nichts von Sequester.

Zwei Jahre später Wiederbestellung. — Lokalbefund: Keine Fistel mehr, keine Druck- und Schmerzempfindlichkeit. Röntgenologisch: kein Sequester, kein neuer Herd. Dagegen starke Pfannenwanderung nach hinten und oben. Bewegungen nicht schmerzhaft und frei. Kleine, beim Gehen nicht auffallende Verkürzung des Oberschenkels.

Fall 4. Frau A. H., 44 Jahre.

Diagnose: Osteomyelitische Tuberkulose der Symphyse, mit Uebergreifen auf den Schambeinaft.

Therapie: Sequesterentfernung, Auslöffeln der Eiterhöhlen, Inzision, Jodierung der Knochenhöhlen, Jodoformgazeverband.

Ausgang: Geheilt entlassen.

Anamnese: Verheiratete Frau, 6 lebende Kinder geboren, wovon 4 noch am Leben sind. Zwei an Lungenentzündung und Fieber (?) †, im Alter von 9 und 10 Wochen. Später traten noch 5 Schwangerschaften auf, die wegen hochgradiger Krampfadern vom Arzt unterbrochen wurden. 1914 wurden dann, um weitere Schwangerschaften zu verhüten, die Ovarien entfernt. Anfang 1921 trat eine Schwellung an der Symphyse auf. Die Haut war gerötet. Nach einigen Wochen begann die Schwellung zu eitern. Vier Wochen später wurde die Frau in Karlsruhe operiert. Inzision der Schwellung; es eiterte lange und stark und fistelte bis jetzt dauernd.

Befund: Gesund und kräftig aussehende Frau in mittlerem E. Z. Lunge und Herz o. B. Abdomen o. B.

Lokalbefund: Ueber der Mitte der Symphyse eine reichlich bohngroße Fistelöffnung inmitten einer längs verlaufenden Narbe. Mit der Sonde stößt man auf Knochen. Aus der Fistel dauernde Absonderung dünnflüssigen gelblichen Eiters. **Röntgenaufnahme:** Der mittlere Teil der Symphyse zeigt in 3 cm Breite fast vollständigen Zerfall; nur kleine Brücken bestehen.

Diagnose: Osteomyelitis tuberculosa symphyseos.

Operation: (Prof. v. Redwitz) in Allgemeinnarkose. Querschnitt über der Symphyse. Man kommt bald auf die Knochenhöhlen, aus denen 4 Sequester entnommen werden. Dann wird nach Zurückdrängen des Periostes die Höhle mit dem Meißel erweitert. Man stößt dabei auf eine weitere Nebenhöhle, die auch erweitert wird. Nachdem glatte und gesunde Knochenverhältnisse geschaffen sind, wird für eine nach vorn bestehende Tasche eine Gegeninzision in der Leistenbeuge gemacht und ein Drain eingelegt. Gründliche Jodierung der Knochenhöhlen, 2 Situationsnähte, Jodoformgazeverband. Bei der Wiederaufnahme findet sich eine etwa 3 cm lange Narbe, welche zum Teil mit der Symphyse fest verwachsen und eingezogen ist. Ueber der Symphyse kleine Fistel, welche in den Knochen führt. Das übrige Knochenystem o. B. Patientin weigert sich, eine größere Operation vornehmen zu lassen und wird wiederbestellt mit dem Rat, nach $\frac{1}{2}$ Jahr sich wieder vorzustellen, was sie aber nicht ausführte.

Das histologische Präparat zeigte tuberkulöses Granulationsgewebe.

Die Anamnese deutete nicht auf Tuberkulose hin, ebenso wenig der klinische Befund. Der Lokalbefund war der einer gewöhnlichen Osteomyelitis. Nur das histologische Präparat bestätigt die Diagnose: Tuberkulöse Osteomyelitis. Die Therapie unterschied sich von der Osteomyelitistherapie in keiner Weise.

Fall 5. Eduard O. 27 Jahre.

Diagnose: Caries der Symphyse.

Therapie: Inzision über der Symphyse, Ausräumung von Granulationen und Sequestern, Jodierung, Verband.

Ausgang: Geheilt entlassen.

Anamnese: Patient war früher, abgesehen von Kinderkrankheiten, angeblich immer gesund. Im Kriege 1916 Gasvergiftung. 1917 im April Steckfuß in die rechte Schulter; hat keine Bewegungsstörungen des rechten Armes beobachtet. Nie Bluthusten oder sonstige Beschwerden. Vor 3 Jahren Gonorrhoe; seitdem Brennen beim Wasserlassen und trüben Urin. Die Behandlung der Go. dauerte 2 Jahre. Keine Beschwerden bei der Stuhlentleerung.

Jetzige Erkrankung: Patient fiel in der Eisenbahnreparaturwerkstätte mit großer Wucht auf den Griff eines Fahreisens, ein Werkzeug, das zum Wegschieben der Eisenbahnwagen dient und zwischen Rad und Schiene angelegt wird. Gleichzeitig wurde er auf den Betonboden geschleudert und fiel mit der rechten Hüfte auf. Er war 10 Minuten bewußtlos, wurde ins Lazarett überführt; dort konnte man keinen besonderen Befund erheben. Wurde entlassen und ging am nächsten Tage wieder zur Arbeit. Bald darauf bekam er Schmerzen an der Innenseite des rechten Oberschenkels dicht unterhalb der Leistengegend. Die Schmerzen nahmen zu und $\frac{1}{2}$ Jahr später bildete sich an der schmerzhaften Stelle eine Verwölbung. Nachdem er zu Hause 14 Tage lang in Bettruhe mit eßigsaurer Tonerde-Umschlägen behandelt wurde, wurden die Beschwerden wesentlich besser. Er arbeitete noch 5 Monate, danach suchte er das Knappschafftslazarett zu Neunkirchen auf. Dort punktierte man dreimal und füllte Jodoformglycerin nach. Anfangs Besserung; 4 Wochen später kam er wieder ins Revier. Von dort aus kurz darauf wegen Haemoptoe in die Lungenheilstätte Homburg. Auch dort zeigten sich wieder Schmerzen und Schwellung am rechten Oberschenkel. Der Abzeß wurde inzidiert, die Abzeßhöhle wurde alle 8 Tage mit Jodoformglycerin gefüllt. Die Wunde heilte nicht mehr zu und eiterte bis zur Aufnahme in die hiesige Klinik weiter.

Befund: Mittelgroßer, wenig kräftig gebauter Mann in mittlerem E. Z. Blasse Gesichtsfarbe. Lungen: leichte Dämpfung über der rechten Spitze, verdärftes Exspirium. Röntgenologisch: beidseits Hilus Schatten, Verdickung beider Spitzen. Herz perkutorisch und auskultatorisch o. B. Keine Vergrößerung der Milz- und Leberdämpfung. Etwas Druckempfindlichkeit in der rechten Unterbauchgegend dicht oberhalb des Leistenbandes. Dort befindet sich ein Tumor. Auf der Innenseite des rechten Oberschenkels Fistel. Bei Druck auf den Tumor entleert sich Eiter aus der Fistelöffnung. Leichte Schmerzhaftigkeit im rechten Hüftgelenk, doch finden sich keine Symptome für eine Erkrankung des Hüftgelenks. — Röntgenologisch: Caries der Symphyse. — Operation: (Prof. Kleinschmidt). Excision der Fistel. Inzision über der Symphyse, Ausräumung der tuberkulösen Granulationen und mehrerer Sequester. Ausgiebige Iodierung, völliger Schluß durch Naht. Verband. Die Naht ging dann oberhalb der Symphyse an einer 3 cm langen Strecke auf, es wurde ein Drain eingelegt. Ungefähr 3 Wochen später Entfernung der Nähte. Der Tumor in der rechten Unterbauchgegend wollte sich trotz Operation nicht zurückbilden. Patient wurde bis zu seiner Entlassung 5mal punktiert und mit Röntgen bestrahlt; schließlich schloß sich die Fistel nach 4½ Monaten, jedoch war in der rechten Unterbauchgegend noch ein dicker Strang zu fühlen. 1½ Jahre später wird dem Patienten wegen eines Coekumtumors eine Ileotransverlostomie angelegt. Die Art des Tumors war aus dem Krankenbericht nicht zu ersehen. Die Möglichkeit eines Zusammenhanges mit der tuberkulösen Osteomyelitis besteht, ist doch auch nach Osteomyelitis der Tibia ein Sarkom beobachtet worden. Genau so könnte die tuberkulöse Osteomyelitis des Schambeins die Ursache für einen tuberkulösen (?) Tumor abgeben, auch wenn er sich nicht an der Stelle der Osteomyelitis, sondern in einem Nachbarorgan (z. B. Coekum) sich bildete.

Soweit die Heidelberger Fälle. Die Prozentzahl der Osteomyelitiden des Schambeins in Bezug auf sämtliche Osteomyelitiden der Heidelberger Klinik beträgt 0,7%. Die Verteilung der Osteomyelitiden auf die verschiedenen Knochen erschien mir interessant, deshalb lasse ich eine Statistik der an der Heidelberger Klinik behandelten Fälle von Osteomyelitiden folgen:

Osteomyelitiden an der Heidelberger Klinik 1920—1930. (Ende Juli)

Lokalisation:	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1920-1930 total
humerus	4	1	4	5	3	3	4	6	1	2	1	34
radius bezw. ulna	—	1	1	2	3	6	9	2	3	4	1	33
femur	15	6	13	7	10	15	8	7	16	8	8	113
tibia bezw. fibula	16	19	12	7	15	19	13	11	15	13	5	145
clavicula	—	1	1	1	—	2	1	—	—	—	—	6
sternum	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
costa	—	1	2	—	—	—	1	—	1	2	—	7
vertebrae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schädeldach	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	4
os zygomaticum	—	—	—	—	—	—	—	1†	—	1	—	2
Oberkiefer	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
Unterkiefer	1	—	2	—	1	5	1	1	2	2	1	16
Zungenbein	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
calcaneus	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
talus	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	4
sonstige Mittelfußknochen	1	—	1	1	—	1	1	—	3	—	—	8
Fußwurzelknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Fußphalangen	—	2	—	1	—	1	2	—	1	—	1	8
Handwurzelknochen	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Mittelhandknochen	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Handendphalangen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Os ileum	2	1	2	2	—	2	1	1	5	—	—	18
os ischii	—	1	—	—	2	—	3	—	1	1	—	7
scapula	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Kreuzbein	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
os pubis	2	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	5
Summe	44	36	39	31	36	56	46	29	53	35	19	424

Eine Zusammenstellung verschiedener Verhältniszahlen der Osteomyelitiden des Beckens bringt Klemm:

	Os ilei.	Os ischii.	Os sacrum.	Os pubis
Fröhner	16	—	—	—
Jordan	2	—	—	—
Niedzielski	1	—	—	—
Lexer	1	—	—	—
Kirchner	—	—	—	1
Hahn	—	—	7	—
Dahler	—	—	3	—
Landerer	—	—	—	1
Meyer	—	—	—	3
In Heidelberg fanden wir (1920—1930 [Juli])	18	7	2	5

Auffällig ist, daß von keinem der Autoren Osteomyelitiden des Os ischii beobachtet worden sind und wir in Heidelberg 7 Fälle im Verlauf von 10 Jahren behandeln konnten.

Und nun zur Ätiologie der Osteomyelitis des Schambeins. Hauptrolle kommt dem Trauma zu. Es wird hierdurch ein Locus minoris resistentiae gesetzt und der Bakterienanfiedelung Vorhub geleistet. Die Fälle, welche in der Tabelle zusammengestellt sind, beweisen nicht alle diese Ansicht. In Wirklichkeit ist es aber doch so, daß oft ein Trauma vorliegt, aber daselbe dem Gedächtnis des Patienten gerade nicht gegenwärtig ist und wir von dem Trauma nichts erfahren. Es ist doch auffallend, daß Thomschke gerade 3 Fälle bei Soldaten beobachtete, die bei den Felddienstübungen doch reichlich traumatischen Infekten ausgesetzt waren. Ferner scheint die arbeitende Klasse besonders heimgesucht zu sein und hier spielt ohne Zweifel das Trauma ebenfalls eine große Rolle. Ein relativ großes Kontingent stellen die Kinder; hier sind Trauma und Epiphysekerne zusammen von Bedeutung, ebenso beim Adoleszenten. Es ist bekannt, daß sich in den Epiphysen gerne Bakterien niederlassen wegen des Gefäßreichtums der Epiphysenkerne. In der Tat sind von den Anatomen (Merkel) und Röntgenologen (Köhler) im Bereich des Tuberculum pubicum und im Angulus pubicus Epiphysenkerne entdeckt worden. Es ist nun so, daß normalerweise diese Knochenkerne bereits im 5. bis 6. Foetalmonat angelegt werden, aber auch können sie erst am 18. bis 20. Jahre auftreten, (Spätepiphysenkerne), welche dann gegen das 21. bis 25. Lebensjahr verknöchern. Es ist also hierin eine weitere Ursache gegeben für die Entstehung der Osteomyelitis des

Schambeins. Man müßte sich eigentlich wundern, daß die Epiphytenkerne so spät erst röntgenologisch entdeckt wurden. Dies hängt damit zusammen, daß bei den gebräuchlichen Röntgenaufnahmen diese Kerne, da verdeckt, nicht zur Darstellung kommen, dagegen aber bei der adfialen Durchleuchtung. (Schinz). Warum ist nun die Osteomyelitis des Schambeins so selten? Zunächst weil das Schambein viel seltener traumatisch infultiert wird als andere Knochen, z. B. das Schienbein. Vor allem liegt der Grund darin, weil das Schambein so wenig spongiöse Substanz besitzt. Ein weiterer Faktor zur logenannten primären Osteomyelitis ist eine vorhergegangene lokale Infektionserkrankung. Wir wissen, daß bei Pneumonie, Phlegmone, Typhus, Furunkel die Entzündungserreger im Blute kreifen und sich dann, wenn sie einen locus minoris resistentiae gefunden haben, auch im Knochen absetzen. Sogar eine intra-uterine Deponierung des Virus ist möglich und beobachtet. Elgart berichtet einen Fall von Osteomyelitis 10 Tage nach der Geburt. Die Mutter des Kindes erkrankte im 7. Monat der Gravidität an akutem Gelenkrheumatismus und 10 Tage nach der Geburt das Kind an Osteomyelitis beider Schienbeine.

Ueber die Beziehungen der Knochengefäße zur akuten Osteomyelitis schreibt Nußbaum, daß die gegen die Epiphytenfugen ziehenden arteriellen Gefäße, welche aus den metaphylären Stämmen und aus dem diaphylen Marknetz entstehen, wahre Endarterien im Sinne Cohnheim's sind. Dort setzen sich auch die bakteriellen Embolien nieder. Die Epiphytenkerne des Schambeins verknöchern nun aber in der Regel frühzeitig und so wird hierdurch die Osteomyelitis des Schambeins so selten. In der Beckenschaukel dagegen sind die Osteomyelitiden relativ am häufigsten (unter den Beckenosteomyelitiden. Lexer hat durch experimentelle Beweise gezeigt, daß dort gerade in der Mitte der Beckenschaukel sich eine reichliche Gefäßverzweigung findet, im Os ischii ist sie gering und im Os pubis nur in verschwindendem Maße vorhanden.

Die Diagnose der Schambeinosteomyelitis läßt sich nur stellen, wenn lokale Erscheinungen vorhanden sind. Als solche sind zu erwähnen: Schwellung und Druckschmerz. Die Schmerzen können subjektiv ganz verschieden lokalisiert werden, so in der Leistenbeuge, in der Symphytengegend, in den Oberschenkel, in die Blafengegend, in die Rektusinfertion. Typisch sind Schmerzen im Hüftgelenk oder in der Leistenbeuge oder beides zusammen. Die übrigen Zeichen der Osteomyelitis fehlen bei der Schambeinosteomyelitis

natürlich nicht: schlechtes Allgemeinbefinden, hohes Fieber und Hyperleukocytose. Besonders müssen die Schambeinäste druckschmerzempfindlich sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß auch die gegen das Becken lehende Fläche des Schambeins der Ausgangspunkt der Erkrankung sein kann (Klemm). Es ist deshalb die Untersuchung per rectum unerlässlich zur Sicherung der Diagnose. Die Schwellung kann ödematös sein und fluktuieren. Der Oberschenkel wird oft in Beugung und Abduktion, mitunter auch Außenrotation gehalten. Auch eine verstärkte Venenzeichnung sogar am Genitale kann das Bild vervollständigen. Eine wirkliche Bestätigung der Diagnose liefert aber nur das Röntgenbild, welches unbedingt zur Klärung jedes Falles herangezogen werden muß, sofern nicht Sequester und Fistelgänge die Diagnose: Osteomyelitis sicherstellen.

Differentialdiagnostisch kann die Osteomyelitis des Schambeins große Schwierigkeiten bereiten. Eine Appendicitis kann genau dasselbe Bild vortäuschen. Die Druckempfindlichkeit am Mac Burney'schen Punkt braucht nicht unbedingt für Appendicitis zu sprechen, denn es kann bei einer Schambeinosteomyelitis der Mac Burney'sche Punkt auch besonders schmerzempfindlich sein. Ferner kann die Osteomyelitis ebenso akut und stürmisch auftreten wie eine Appendicitis, ja gerade diese Fälle sind als die schwersten beschrieben und gehen meistens in ganz kurzer Zeit, ja in wenigen Stunden, unter dem Bilde des Sepsis ad exitum. Auch ein Senkungsablaß kann die Symptome der Osteomyelitis des Schambeins vortäuschen, letzten Endes sogar das Rheuma. Es muß deshalb die Anamnese ganz besonders sorgfältig aufgenommen werden, ob Trauma zu eruieren ist, ob eine Angina, Scharlach, Diphtherie oder sonstige Infektionskrankheit vorausgegangen ist. Nach diesen Krankheiten ist bei entsprechendem Befund die Annahme einer Osteomyelitis des Schambeins richtiger als z. B. einer Appendicitis. Ebenso ist der Psoasablaß differentialdiagnostisch auszuschließen! Auch die Osteochondritis ischio-pubica, eine Krankheit, welche auf fehlerhafte Ossifikation der Synostosis ischio-pubica beruht, könnte vielleicht mit einer Osteomyelitis des Schambeins verwechselt werden. Das Bild der Osteochondritis ischio-pubica ist als Krankheitsbild sui generis erst seit etwa 15 Jahren bekannt. Wir finden Verdickungen an der Schambeinfortsatzbeingrenze, Schmerzen in der Hüfte oder Leistengegend und Hinken. Röntgenologisch Aufhellungen an der Schambeinfortsatzbeingrenze. Wesentlich zur Unterscheidung von der Osteomyelitis des Schambeins ist, daß hier kein Fieber vorhanden ist und die Krankheit nicht mit

stürmischen Erscheinungen auftritt und die Leukocytose fehlt. Jedenfalls könnte aber eine beginnende mit leichten Erscheinungen einsetzende Osteomyelitis des Schambeins gelegentlich auch mit der Osteochondritis ischio-pubica verwechselt werden.

Ueber die Lokalisation der Schambeinosteomyelitis wäre zu sagen, daß der obere Schambeinaast weit bevorzugter ist als der untere. Das mag nun wieder urfächlich mit dem Trauma zusammenhängen, denn der obere ist leichter Infekten zugänglich als der untere.

Der Erreger ist wie bei allen anderen Osteomyelitiden meistens der *Staphylococcus pyogenes aureus*, aber auch haemolytische Staphylokokken und Streptokokken sind als Erreger der Schambeinosteomyelitis beobachtet worden. Wenn auch noch nicht beobachtet und beschrieben, so könnte doch genau so wie an den langen Röhrenknochen auch gelegentlich am Schambein eine typhöse, gummöse, gonorrhoidale oder sonstige Osteomyelitis wie z. B. Pneumokokken-Osteomyelitis auftreten.

Ueber die Therapie der Osteomyelitis im allgemeinen wird noch sehr gestritten. Es gibt 3 Lager, die alle ihr „Für und Wider“ haben. Beust führt eine Vakzine-therapie durch. Aeußerst konservativ behandeln Colvin, Oedtsner, Crille und Clopton. Sie verlangen, daß das Knochenmark in akuten Fällen freizulegen ist, aber nur in beschränkter Ausdehnung von einer Seite her, aber niemals zu entfernen, da es zur endostalen Regeneration notwendig sei. Die Knochenhöhle wollen sie mit Guttapercha, nicht mit Gaze drainiert wissen. In subakuten und chronischen Fällen wendet Clopton statt der Drainage die Jodoformknochenfüllung an. Auch bei der Sequesterentfernung vermeidet er peinlichst Auskratzen. Bei ausgedehnter Erkrankung macht Clopton die subperiostale Refektion, aber erst dann, wenn das Periost anfängt, neuen Knochen zu bilden, d. h. ungefähr 6 Wochen nach Beginn der Erkrankung. Ob er diese für die Röhrenknochen aufgestellten Forderungen in gleicher Weise auf das Schambein anwenden würde, weiß ich nicht. Die einfache Abzessinzision machen Bier, Brandt und Rost. Rost glaubt, daß durch das Aufmeißeln des Knochens Keime in die Markhöhle verschleppt werden und nichtinfizierte Teile hierdurch neu infiziert werden, eine Ansicht, die viel für sich hat, aber nur mit Einschränkung, wie wir später sehen werden. Brandt ist nicht so streng in seiner Auffassung und gibt zu, daß in einem kleinen Teil der Fälle eine Aufmeißelung doch erforderlich sei, im allgemeinen aber sollte man sich mit der Inzision des subperiostalen Abszesses begnügen. Naegeli tritt warm für

die Trepanation ein, welche ebenfalls wieder von Rost verworfen wurde. Plenz will die Entfernung des Markes, aber nicht als schematische Grundregel, sondern mit Ausnahmen. Rost hat schon verschiedentlich mit statistischem Material zu beweisen versucht, daß er mit der Punktion genau so gute, ja bessere Erfolge habe, als andere mit den übrigen Methoden. Plenz widerlegt das; er berichtet Fälle, wo die Aufmeißelung bestimmt zum Ziel geführt hätte, die von ihm (Plenz) angewandte Punktion aber nicht angebracht war. Es läßt sich hierin schwer ein Schema aufstellen. Endlich gibt es noch ein ganz radikales Lager, das einfach die subperiostale Resektion vornimmt und glaubt, damit den ganzen Krankheitsherd am sichersten beiseite geschafft zu haben. Die Ansicht hat viel für sich. Wenn das Periost erhalten bleibt, z. B. am horizontalen Schambeinast, so bildet sich meistens neuer Knochen vom Periost aus. Das Knochenmark ist eben nicht unbedingt erforderlich zur Regeneration neuen Knochens (Lexer, Enderlen). Es ist vielleicht beim akuten subperiostalen Abzeß nur die Inzision angebracht, bei Sequestern die Entfernung und die Necrotomie und bei stark nekroledurchsetzten Knochen die subperiostale Resektion die gegebene Methode. Wir in Heidelberg wendeten bei unseren 3 typischen Fällen nur die Inzision, bei den tuberkulösen Osteomyelitiden einmal die Aufmeißelung der Markhöhle und einmal die „Ausräumung der Markhöhle“ (jedenfalls mit dem scharfen Löffel) an. In den 16 mir bekannten Fällen wurde folgendermaßen vorgegangen:

Fälle	Punktion.		Inzision.		Aufmeißelung.		Auskrat- zung.		subperiostale Resektion	
	geheilt	†	geheilt	†	geheilt	†	geheilt	†	geheilt	†
Literatur	—	1	1	—	2	1	1	—	4	1
Heidelberg	—	—	2	1	1 tb.	—	1 tb.	—	—	—
	—	1	3	1	3	1	2	—	4	1

Wir haben mit der Inzision in Heidelberg gute Erfolge gesehen. Aus den 5 behandelten Fällen läßt sich aber keine Regel ableiten; wir müssen da schon die Behandlung der Osteomyelitiden der Röhrenknochen betrachten und ihre Ergebnisse auf die platten Knochen anwenden. Der Fälle sind noch viel zu wenig, um eigene Anschauungen über die Behandlung der Osteomyelitis des Schambeins zu bekommen.

Zudem ist man sich in der Ansicht der Therapie im allgemeinen noch lange nicht einig. Es hat jede Ansicht ihre Berechtigung; der Tod aber jeder Therapie ist das Schema. Wir ziehen im allgemeinen die Aufmeißelung trotz der Bedenken von Rost anderen Methoden vor, wenden sie aber nicht starr und schematisch an. Bei der Aufmeißelung wird das Mark weit bis ins Gefunde entfernt. Unnötiges Periost wegnehmen wird streng vermieden. Für die Osteomyelitis des Schambeins halte ich die subperiostale Resektion für die meisten Fälle am besten. Es ist die beste Gewähr dadurch gegeben, daß der Prozeß nicht ins Hüftgelenk fortgeleitet wird. Gewiß wird ein empfindlicher Defekt geschaffen. Aber es bildet doch auch das Periost neuen Knochen nach. Kann man Periost nicht belassen, so besteht immer noch die Möglichkeit der Transplantation eines Periostknochenspans an Stelle des resezierten Schambeinastes. Will man die Resektion nicht, so kann man den Knochen bis auf eine kleine gesunde Periostknochenbrücke wegmeißeln. Aber Grundsatz muß bleiben: gründliche Eröffnung des Herdes. Zum mindesten muß die Inzision verlangt werden, denn die Punktion dürfte keineswegs genügenden Abfluß des Eiters verschaffen.

Bier fordert die Entfernung alles Kranken und Füllen des Hohlraumes mit Blut oder Serum, dann luftdichten Abschluß. Bei der Schambeinosteomyelitis habe ich diese Methode nie angewandt gefunden. Man hat stets nach der Operation Drains eingelegt, um dem etwa nachfolgenden Eiter Abfluß zu verschaffen. Blut und Serum üben gewiß einen ungemein starken Reiz auf die Knochenneubildung aus. Das hat Bier experimentell bewiesen. Diese Methode ist anwendbar, wenn wirklich alles Kranke entfernt ist. Bei der Schambeinosteomyelitis ist aber die Gefahr zu groß, daß noch nekrotischer Knochen vorhanden sein könnte. Wird nun mit Blut gefüllt und verschlossen, so bekommen die Bakterien einen äußerst günstigen Nährboden. Es wäre dann mehr geschadet als genutzt; gerade darin glaube ich liegt der Grund, weshalb die Bier'sche Methode bei der Schambeinosteomyelitis überhaupt nicht angewandt wurde.

Die Osteomyelitisfrage hat auch einen interessanten Streitpunkt gebracht, indem die einen behaupten, die Nekrose sei eine Folge der Eiterung, die anderen, Eiterung mache keine Nekrose, sondern sei eine Folge der Eiterung. Bis jetzt weiß man nur, daß jede Partei gewissermaßen Recht haben will und man sich so schnell über diesen Streitpunkt nicht einig wird. Diese Ansichten blieben in Bezug auf die Osteomyelitis-therapie nicht ohne Erfolg und so kommt es, daß die einen den Eiter

für eine Schädigung halten, die anderen für eine Abwehrreaktion.

Die Meisten stellen die Forderung, daß dem Eiter Abfluß geschaffen und alles Krankhafte gründlichst entfernt werden müsse. Es würde zu weit führen, diese Streitfrage auf die Schambeinosteomyelitis anzuwenden.

Worin liegen nun die Gefahren der unbehandelten Osteomyelitis des Schambeins? Zunächst droht Fortleitung auf die Symphyse mit Symphylenlösung und Uebergreifen auf das andere Schambein. Ebenso Fortleitung in das Sitzbein und als gefährlichste die Fortleitung in das Gelenk. Letzten Endes kann auch das Kreuzbein mit ergriffen werden und wir sehen dann das Bild der gefährlichsten Osteomyelitis. Auch vollständige Lösung des Schambeins aus dem Bereich des knöchernen Beckenrings ist beobachtet. (v. Bergmann, Thomschke und Esau). Auch kann Senkung in die untere Extremität folgen und als schlimmste Komplikation die Sepsis.

Die Tuberkulose des Knochens wird im allgemeinen sowohl in den Lehrbüchern der Chirurgie als auch in denen der Pathologie als eigenes Kapitel behandelt. Sie gehört aber, soweit es sich um eine tuberkulöse Entzündung des Markes handelt, zum „Kapitel Osteomyelitis“. Unterscheidet man doch eine Osteomyelitis typhosa, leprosa usw.

Die tuberkulöse Osteomyelitis des Schambeins ist noch seltener als andere Osteomyelitiden. In der Literatur sind keine Fälle von tuberkulöser Osteomyelitis mit alleinigem Sitz am Schambein berichtet. Die Fälle, welche wir hier beobachteten, waren hartnäckig in der Behandlung und von ungemein lang dauerndem Verlauf. Im allgemeinen tritt die tuberkulöse Osteomyelitis nicht so stürmisch auf als z. B. die Staphylokokken- oder Streptokokken-Osteomyelitis. Die Temperaturen sind subfebril. Viele der Fälle reagieren gut auf ultraviolette Licht und im Hochgebirge sah man Fälle ausheilen, welche lang fistelten und sequestrierten. Die Aetiologie in Bezug auf Trauma ist nach Lexer die, daß ein bisher abgekapselter reizloser Knochenherd durch Verletzung des Gewebes eröffnet wurde. Eine Ablagerung der Bazillen aus der Blutbahn an Orte der Gewalteinwirkung wie bei den Eiterkokken am locus minoris resistentiae ist bei der wesentlich embolischen Verbreitung der Erkrankung unwahrscheinlich, und durch Versuchsergebnisse (Hosfell) verneint worden.

Zum Schluß noch einige Worte über die Caries der Symphyse. Meistens tuberkulöser Natur, kommt sie primär und auch von benachbarten Knochen aus fortgeleitet

vor. Bei unserem Fall (Nr. 4 der Krankengeschichte) ist schwer zu bestimmen, ob die Erkrankung primär von der Symphyse ausging oder vom Schambein.

Bekannt sind aus der Literatur nur 10 Fälle. Die Tuberkulose der Symphyse scheint bei Frauen häufiger als bei Männern. Der Partus mit den damit verbundenen Zerrungen am Beckenring darf als Trauma gelten (Tillmanns). Ebenso wird im allgemeinen zugegeben, daß wiederholt Traumen resp. traumatische Reizungen begünstigend für die Entstehung der Symphysektuberkulose sind. Es bilden sich meistens über der Symphyse Abzesse und Fisteln. Die Diagnose gründet sich auf charakteristischen Druckschmerz bei Betastung der Symphyse von außen, per vaginam und per rectum, ferner und sonstige Zeichen von Tuberkulose in der Anamnese und Befund. Heilung erfolgt nur bei radikaler Entfernung alles kranken Gewebes; konservative Behandlung ist nach Tillmanns sogar gefährlich.

Zusammenfassung.

Die Osteomyelitis des Os pubis ist eine äußerst seltene und schwere Erkrankung. Sie entsteht häufig nach Trauma; das Hauptkontingent stellt die arbeitende Klasse und Kinder (früher auch Militär). Bei Kindern besteht die Möglichkeit der Lokalisation in den gefäßreichen Epiphyselinien. Die Erscheinungen sind schwer, mitunter stürmisch. Fieber, Schmerzen in der Hüfte und (oder) Leiste; Druckschmerz daselbst und Fluktuation sind Zeichen, welche auf die Schambeinosteomyelitis hindeuten. Der Oberschenkel wird meistens auf der erkrankten Seite gebeugt und abduziert gehalten. Die Therapie besteht am besten in der gründlichen Entfernung alles erkrankten Knochens. Gefahren bestehen in der Fortleitung ins Hüftgelenk und der Sepsis. Zur Diagnose sind noch folgende Punkte streng zu beobachten: Anamnese, Trauma, vorhergehende Infektionskrankheiten (sogar Anginen), lokale Schwellung in der Leistengegend, Schmerzen im Hüftgelenk und in der Leistenbeuge. Die Untersuchung auf Schambeinosteomyelitis hat unbedingt auch per rectum zu geschehen und die Röntgenaufnahme ist unerläßlich. Die Prognose ist bei früh operierten Fällen gut.

Literatur:

- v. Bergmann: Erfahrungen über Beckenosteomyelitis.
Arch. f. klin. Chir. Bd. 81, I S. 504.
- Bier: Beobachtungen über Knochenregeneration.
Arch. f. klin. Chir. Bd. 100, S. 99.
- Brandt: Zur Behandlung der akuten Osteomyelitis.
Dt.-med. Wo. 1922. S. 972.
- Clopton: Referat. Ztrbl. f. Chir. 1915 II, Nr. 29, S. 519.
- Esau: Akute Osteomyelitis des rechten Schambeins und zentrale pathologische Luxation des Oberfemurs.
Dt. Z. f. Chir. 1908. Bd. 91, S. 611.
- Fröhner: Beitr. zur Kenntnis der akuten Osteomyelitis der kurzen und platten Knochen. Beitr. zur klin. Chir. Bd. V, 1899, S. 79.
- Karewski: Sitzungsbericht der freien Vereinigung der Chirurgen Berlins. Ztrbl. f. Chir. 1905. Nr. 35, S. 920.
- Kirchner: Akute asymmetrische Osteomyelitis (Epiphylenlösung der Schambeine) nebst Bemerkungen zur Ätiologie der Osteomyelitis. Arch. f. klin. Chir. 1899, Bd. 58, S. 317.
- Klemm: Die akute Osteomyelitis des Beckens und Kreuzbeins. Brun's Beitr. 1912. Bd. S. 187.
- Köhler: Grenzen des Normalen und Anfänge des Pathologischen im Röntgenbild.
- Lexer: Lehrb. d. allg. Chirurgie. Bd. I, S. 242 ff. und S. 395 ff.
- Maier: Die Behandlung der akuten Osteomyelitis im Stadium des subperiostalen Abszesses, zugleich ein klinischer Beitrag zur Frage der Knochenregeneration. Arch. f. klin. Chir. Bd. 132, S. 303.

- Naegeli: Die Behandlung der akuten haematogenen Osteomyelitis mit primärer Knochenreparation. Münch. med. Wo. 1921. S. 877.
- Nußbaum: Knochengefäße und akute Osteomyelitis. Ztrbl. f. Chr. 1922. S. 700.
- Plaut: Umschriebene Osteomyelitis des Schambeins unter dem Bilde der tuberkulösen Analfistel bei einem Kinde. Klin. Wo. 1923. Jhrg. 2, Bd. 6, S. 262.
- Plenß: Die Behandlung der akuten Osteomyelitis. Münch. med. Wo. S. 879.
- Rosenburg: Beiträge zur Differentialdiagnose der Osteomyelitis. Med. Klinik. S. 749 ff. 1923.
- Trendel: Beiträge zur Kenntnis der akuten infektiösen Osteomyelitis und ihrer Folgeerscheinungen. Brun's Beitr. 1904. Bd. 41, S. 607.
- Tillmanns: Deutsche Chirurgie Bd. 62a, S. 397 ff. u. S. 422.
- Thomschke: Die akute Osteomyelitis des Schambeins. Dt. Z. f. Chir. Bd. 123, 1913, S. 290.
- Wülfig: Ueber Osteomyelitis ischio pubica. Dt. Z. f. Chir. 199. Band, 6. H. S. 413 ff.

Lebenslauf:

Als Sohn des Wagenmeisters Johannes Böhm wurde ich am 13. September 1904 zu Ludwigshafen a. Rh. geboren. Dort besuchte ich die Volksschule und später die Kreisoberrealschule. Nach bestandener Reifeprüfung bezog ich 1924 als Student der Philosophie die Universität München. Im S.S. 1925 wechselte ich nach Heidelberg zum Studium der Medizin über. Im W.S. 1926/27 studierte ich in Würzburg und legte daraufhin nach Schluß des Wintersemesters 1926/27 mein ärztliches Vor-examen ab. Vom W.S. 1927/28 an studierte ich wieder in Heidelberg und bestand dort im Frühjahr 1930 das medizinische Staatsexamen. Zur Zeit bin ich als Medizinalpraktikant an der chirurgischen Ambulanz der hiesigen Universitätsklinik tätig.

K. B ö h m.

